

# 2024 年临夏州中等职业学校学生技能大赛口腔 修复工艺赛项理论样卷（一）

赛位号：\_\_\_\_\_

注意事项：考生仅将自己的座位号填在指定位置，其他信息均不得填写。

得分	评卷人

单项选择题。（每题 2.5 分，共 100 分。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中只有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的答案选择出来并按要求填写在下面答题框内，答在其他地方视为无效，多选、少选或不选均不得分。）

答题框									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1.口腔检查必备的器械是（ ）

- A.口镜、手电和镊子
- B.口镜、探针和镊子
- C.口镜、探针和手电
- D.口镜、镊子和弯盘
- E.口镜、探针和弯盘

2.以下为人工牙的功能的是（ ）

- A.发音
- B.美观
- C.恢复咬合关系
- D.恢复咀嚼功能
- E.以上都是

3.替牙 HE 时期为（ ）

- A.2~6 岁
- B.2、5~6 岁
- C.6~12 岁
- D.9~12 岁
- E.6~15 岁

4.检查松动度时，II 度松动是指牙齿近、远中或颊、舌向的松动幅度在（ ）

- A. 0.5mm 以内
- B. 0.6~0.9mm
- C. 1~2mm
- D. 2.1~2.9mm
- E. 3mm 以上

- 5.恒牙龋齿患龋率最高的牙齿是（ ）
- A.下颌第一磨牙 B.下颌第二磨牙 C.上颌第一磨牙 D.上颌第二磨牙 E.上颌前磨牙
- 6.托盘内面与牙弓内外侧约有（ ）间隙以容纳印模材料
- A.0~1mm B.1~2mm C.2~3mm D.3~4mm E.4~5mm
- 7.副根管多见于（ ）
- A.切牙 B.尖牙 C.前磨牙 D.磨牙 E.多生牙
- 8.不含味蕾的舌乳头是（ ）
- A.叶状乳头 B.菌状乳头  
C.轮廓乳头 D.丝状乳头  
E.以上都不对
- 9.静止龋产生的情况为（ ）
- A. 机体的抵抗力增加 B. 再矿化的能力增加  
C. 口内致龋病菌减少 D. 致龋局部因素消失  
E. 牙面的抗酸力增加
- 10.恒牙龋齿的非好发部位是（ ）
- A.邻面 B.切缘 C.点隙 D.裂沟 E.牙颈部
- 11.诊断为龋齿时，温度测验的结果是（ ）
- A.正常 B.敏感 C.迟钝 D.一过性敏感 E.无反应
- 12.龋病牙体缺损的治疗方法为（ ）
- A.自行修复 B.脱敏治疗 C.药物治疗 D.充填治疗 E.再矿化法
- 13.后牙邻面龋制备的窝洞是 G.V.Black 分类分类的（ ）
- A.第 I 类洞 B.第 II 类洞 C.第 III 类洞 D.第 IV 类洞 E.第 V 类洞
- 14.备洞时下列措施可减少对牙髓的刺激，除外（ ）
- A.冷却水降温 B.选用锐利的车针  
C.间断磨除 D.连续钻磨 E.不向洞壁施加压力
- 15.酸蚀术处理合格的牙釉面呈（ ）
- A.乳白色 B.白垩色 C.黄褐色 D.乳黄色 E.暗灰色
- 16.畸形中央尖多见于（ ）
- A.切牙 B.侧切牙 C.尖牙 D.前磨牙 E.磨牙
- 17.患者生活在高氟区，可造成氟斑牙的时期是（ ）
- A.7 岁以前 B.8~10 岁 C.11~12 岁 D.13~15 岁 E.16 岁以后



A.传递 HE 力，支持义齿 B.恢复咬合关系 C.稳定义齿 D.防止食物嵌塞 E.以上都是

30.HE 支托最厚处大约为 ( )

A. 1~1.5mm B.1.5~2.0mm C.0.5~1.0mm D.1.0~2.0mm E.2.0~3.0mm

31.下面属于间接固位体的是 ( )

A.Kennedy 杆 B.HE 支托 C.切支托 D.指支托 E.以上都是

32.当前后牙均有缺失，余留后牙向舌侧严重倾斜，腭(舌)侧不宜安置大连接体时，可用的连接杆为 ( )

A.舌杆 B.舌板 C.颊杆 D.双舌杆 E.舌隆突杆

33.牙列异常不包括 ( )

A.牙列拥挤 B.牙列稀疏 C.高位牙 D.低位牙 E.弓外牙

34.上颌骨的一体四突不包括 ( )

A.颞突 B.颧突 C.额突 D.牙槽突 E.腭突

35.不属于三叉神经的是 ( )

A.眼神经 B.上颌神经 C.下颌神经 D.岩大神经 E.以上都不是

36.摩擦力大小的产生，主要取决于 ( )

A.修复体与预备牙的接触面积要大 B.预备体的轴壁要平行  
C.修复体与预备体要非常吻合 D.窝洞底面平，点线角清楚  
E.预备体表面粗糙

37.牙齿温度测验的注意事项，除外 ( )

A.先测患牙 B.隔离唾液 C.冷测用小冰棍 D.热测温度为大于 60°C  
E.置牙齿颊(唇)面颈 1/3 处测试

38.检查继发龋的可靠方法为 ( )

A.视诊 B.探诊 C.叩诊 D.温度测试 E.X 线片检查

39.前牙充填后发生牙髓炎的处理是 ( )

A.观察痛消失 B.间接盖髓术  
C.直接盖髓术 D.干髓治疗术  
E.根管治疗术

40.急性牙髓炎的应急处理最好是 ( )

A.开髓引流 B.药物止痛 C.针灸止痛 D.指压止痛 E.局麻止痛